



## Lipoma del cuerpo calloso y Carcinoma Broncígeno de Pulmón. ¿Asociación casual?

Isabel Gonzalez Alemán\*, Ada Aparicio Rodríguez\*, Clara García Enríquez\*, Noel Pedraza Alonso\*

\* Hospital Universitario "Arnaldo Milión Castro", Santa Clara, Villa Clara. CUBA

### Resumen

Los lipomas intracraneales son lesiones raras que constituyen alrededor del 0,1 % de todos los tumores intracraneales; esta frecuencia se incrementa por el desarrollo y uso frecuente de las técnicas de neuroimagen, que han permitido el diagnóstico fortuito de estas lesiones, muchas veces silentes.

La localización más frecuente es supratentorial, el 50 % de las lesiones se ubica en la región pericallosa aunque puede aparecer en otras localizaciones como son; las cisternas cuadrigéminas, carebelosa superior interpedúncular, supraselar y pontocerebelosa.

Son sintomáticos en la mayoría de los casos; cuando no lo son, las crisis epilépticas constituyen el síntoma más común.

Es frecuente la asociación con otras malformaciones intracraneales, sobre todo con la disgenesia del cuerpo calloso.

Nosotros describimos un paciente con diagnóstico por neuroimagen de Lipoma del cuerpo calloso, que se manifestó clínicamente como una epilepsia, corroborado en el estudio necrópsico asociado además con un carcinoma broncígeno de pulmón, comentamos la historia patológica de este enfermo y estudiamos la posible asociación entre el Lipoma y el Carcinoma Broncígeno.